



















リグの使用法いろいろ

■基本型 葉面散布時は400~1000倍液を3~5日おきに3~4回連続散布して下さい。

- 日照不足、低温時、農薬害、肥料濃度障害時は400倍液を基本型にて使用。
- 霜害、風害、湿害、病害等の樹勢低下時は600倍液を基本型にて使用。
- 育苗の生育不良時は1000倍液を基本型にて使用。

■土壌施用時は400~600倍にて灌水して下さい。

種類	使用時期 / 倍率 (目安)		
	1000倍	600~800倍	
果菜類 トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・カボチャ 等	発芽時 	接ぎ木・鉢替え前後 	開花時・幼果時・ホルモン処理時 (混合) 
葉菜類 キャベツ・ハクサイ・レタス・ホウレン草 等	発芽時 	移植・定植時等 	結株ははじめ  収穫5日前 
根菜類 ダイコン・ゴボウ・ニンジン 等	発芽時 	間引後 	収穫7日前 
豆類 大豆・エンドウ豆・インゲン・エタマメ 等	双葉展開時等 	蕾蕾時 	出穂前後 
ネギ類 ネギ・タマネギ・ニラ 等	発芽時・定植時・移植時 		
果樹			収穫後・出蕾時・開花時・着色時・幼果時・収穫7日前
花卉類	さし芽時 		出蕾時・開花時  出荷2日前 
茶			1・2番茶/萌芽時・摘採後

腐植蛋白
有機葉面散布材

□ **LIGU** リグ

アミノ酸成分 (100g中)

・プロリン	161mg
・グルタミン酸	96mg
・アラニン	75mg
・リジン	30mg
・その他	13種

【注意事項】

- ①用途にあった希釈倍率にてご使用下さい。
- ②アルカリ性・銅剤農薬等の混合散布はできません。
- ③保管時は直射日光を避けて下さい。
- ④目に入った時は、すぐ水道水にて洗い流して下さい。
- ⑤飲料しないで下さい。